



Sprache: **Bulgarisch**

ВЪЗРАСТ	(навършени седмици)	Кърмачета		(навършени месеци)	Малки деца		Деца		(навършени години)	Юноши		Възрастни	
	6	2	3	4	11-14	15-23	2-4	5-6	7-8	9-14	15-17	с 18	с 60
ВАКСИНА			U4		U6	U7	U7A/8	U9	U10	J1			
Тетанус		G1	G2	G3	G4	N		A1	N		A2	A ^f (на всеки 10 години, съотв. N)	
Дифтерия		G1	G2	G3	G4	N		A1	N		A2	A ^f (на всеки 10 години, съотв. N)	
Коклюш Пертусис		G1	G2	G3	G4	N		A1	N		A2	A ^f (съотв. N)	
Детски паралич Полиомиелит		G1	G2 ^a	G3	G4	N					A1	съотв. N	
Хепатит В		G1	G2 ^a	G3	G4	N							
ХИБ Хемофилус инфлуенце тип В		G1	G2 ^a	G3	G4	N							
Пневмококи ^g		G1		G2	G3	N						S ^c	
Ротавирус		G1 ^b	G2	(G3)									
Менингококи Серогрупа С					G1 (с навършени 12 месеца)		N						
Морбили					G1	G2	N					S ^d	
Паротит, рубеола					G1	G2	N						
Дребна шарка Варицела					G1	G2	N						
Грип Инфлуенца												S (ежегодно)	
HPV Човешки папилома вирус							G1 ^e	G2 ^e	N ^e				

Следващи срокове за имунизация



Gefördert durch:



aufgrund eines Beschlusses
 des Deutschen Bundestages

ОБЯСНЕНИЯ

- G** ПЪРВИЧНА ИМУНИЗАЦИЯ (до 4 приема G1 - G4)
- S** СТАНДАРТНА ИМУНИЗАЦИЯ
- A** РЕИМУНИЗАЦИЯ
- N** НАВАКСВАЩА ИМУНИЗАЦИЯ (Първична имунизация на всички още неваксинирани лица или такива с незавършена имунизационна серия)
- U** Преглед за ранно разпознаване
- J** Преглед на юноши (J1 на възраст от 12 до 14 години)

- ^a При прилагане на моновалентна ваксина тази доза може да отпадне.
- ^b Първата ваксинация може да се направи още след навършване на 6 седмици, в зависимост от използваната ваксина се изискват 2 или 3 дози през интервал от поне 4 седмици.
- ^c Еднократна ваксинация с полизахаридна ваксина, наваксваща имунизация се препоръчва само за определени индикации.
- ^d Еднократна ваксинация за всички родени след 1970 лица над 18 години с неясен имунизационен статус, без ваксинация или само с една ваксинация в детска възраст. За предпочитане е да се направи с ваксина против морбили, паротит, рубеола.

- ^e Стандартна имунизация за момичета на възраст от 9 до 13 или 9 до 14 години (в зависимост от използваната ваксина), брой на дозите ваксина – виж информацията за фармацевтичния препарат!
- ^f Реимунизация срещу тетанус и дифтерия на всеки 10 години. Следващ прием на ваксина срещу тетанус и дифтерия еднократно като комбинирана ваксина TdaP (против дифтерия, тетанус, коклюш) или при съответни индикации като комбинирана ваксина TdaP-IPV (против дифтерия, тетанус, коклюш и полиомиелит).
- ^g Новородените получават допълнителна доза на възраст от 3 месеца, т.е. общо 4 дози.